

Antonio Cipriano Santiago Zaragoza

Departamento de Matemáticas

Mayo de 1999

CRITERIOS DE CONVERGENCIA PARA SERIES

Series de términos cualesquiera

Condición necesaria de convergencia: Sea $\sum a_n$ una serie de números reales convergente. Entonces $\{a_n\} \rightarrow 0$.

Criterio general de convergencia o criterio de Cauchy: Sea $\sum a_n$ una serie de números reales. Son equivalentes:

i) $\sum a_n$ es convergente

ii) $\forall \varepsilon > 0, \exists m \in \mathbb{N} : \text{si } n \geq m \text{ y } h \in \mathbb{N} \text{ es arbitrario, entonces}$

$$|a_{n+1} + a_{n+2} + \dots + a_{n+h}| < \varepsilon$$

Test de comparación: Sean $\sum a_n$ y $\sum b_n$ series de números reales. Supongamos que $|a_n| \leq b_n, \forall n \in \mathbb{N}$ y que la serie $\sum b_n$ es convergente. Entonces, $\sum a_n$ es convergente y se verifica que

$$\left| \sum_{n=1}^{+\infty} a_n \right| \leq \sum_{n=1}^{+\infty} b_n$$

En particular, si $\sum a_n$ es una serie de números reales y $\sum |a_n|$ es convergente, entonces la serie $\sum a_n$ es convergente y se tiene que

$$\left| \sum_{n=1}^{+\infty} a_n \right| \leq \sum_{n=1}^{+\infty} |a_n|$$

Series de términos positivos

Criterio de comparación por paso al límite: Sean $\{a_n\}, \{b_n\} \subset \mathbb{R}^+$.

i) Supongamos que $\left\{ \frac{a_n}{b_n} \right\} \rightarrow L \in \mathbb{R}^+$. Entonces

$$\sum a_n \text{ convergente} \Leftrightarrow \sum b_n \text{ convergente}$$

ii) Si $\left\{\frac{a_n}{b_n}\right\} \rightarrow 0$ y $\sum b_n$ es convergente, entonces $\sum a_n$ es convergente.

iii) Si $\left\{\frac{a_n}{b_n}\right\} \rightarrow +\infty$ y $\sum a_n$ es convergente, entonces $\sum b_n$ es convergente

Criterio de la raíz o de Cauchy: Sea $a_n \geq 0$.

i) Si $\lim_{n \rightarrow +\infty} \sqrt[n]{a_n} = L > 1 \Rightarrow \sum_{n \geq 1} a_n$ no converge

ii) Si $\lim_{n \rightarrow +\infty} \sqrt[n]{a_n} = L < 1 \Rightarrow \sum_{n \geq 1} a_n$ converge

Criterio de Kummer: Sean $a_n, b_n \geq 0$.

i) Si $\exists \varepsilon > 0$, y $\exists p \in \mathbb{N}$: para $n \geq p$ se tiene que $b_n - b_{n+1} \frac{a_{n+1}}{a_n} \geq \varepsilon$, entonces $\sum a_n$ es convergente

ii) Si $\exists p \in \mathbb{N}$ tal que, para $n \geq p$, se tiene $b_n - b_{n+1} \frac{a_{n+1}}{a_n} \leq 0$ y la serie $\sum \frac{1}{b_n}$ no es convergente, entonces la serie $\sum a_n$ tampoco converge.

Criterio del cociente o de D'Alembert: Sea $a_n > 0$.

i) Si $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = L > 1 \Rightarrow \sum_{n \geq 1} a_n$ no converge

ii) Si $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = L < 1 \Rightarrow \sum_{n \geq 1} a_n$ converge

Criterio de Raabe: Sea $a_n \geq 0$.

i) Si $\lim_{n \rightarrow +\infty} n \left(1 - \frac{a_{n+1}}{a_n}\right) = L > 1 \Rightarrow \sum_{n \geq 1} a_n$ converge

ii) Si $\lim_{n \rightarrow +\infty} n \left(1 - \frac{a_{n+1}}{a_n}\right) = L < 1 \Rightarrow \sum_{n \geq 1} a_n$ no converge

Criterio $n^k a_n$ o de Pringsheim: Sea $a_n \geq 0$.

i) Si $\lim_{n \rightarrow +\infty} n^k a_n = L > 0$ entonces: $\sum_{n \geq 1} a_n$ converge $\Leftrightarrow k > 1$

ii) Si $\lim_{n \rightarrow +\infty} n^k a_n = 0$ y $k > 1 \Rightarrow \sum_{n \geq 1} a_n$ converge

iii) Si $\lim_{n \rightarrow +\infty} n^k a_n = +\infty$ y $k \geq 1 \Rightarrow \sum_{n \geq 1} a_n$ no converge

Criterio de condensación: Sea $\{a_n\} \searrow$ con $a_n \geq 0$. Entonces,

$$\sum a_n \text{ converge} \Leftrightarrow \sum 2^n a_{2^n} \text{ converge}$$

Criterio: Si $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{f(n)}{n^k} = L > 0$ entonces: $\sum_{n \geq 1} f\left(\frac{1}{n}\right)$ converge $\Leftrightarrow k > 1$

Criterio (Caso particular del criterio de Pringsheim): Sea $a_n = f\left(\frac{1}{n}\right) \geq 0, \forall n \in \mathbb{N}$ y tal que f es derivable en 0 con $f(0) = f'(0) = 0$. Supongamos que $f \in C^2(I)$ con $0 \in I$. Entonces, $\sum_{n \geq 1} f\left(\frac{1}{n}\right)$ converge.

Criterio integral: Sea $f : [1, +\infty[\rightarrow \mathbb{R}$ una función positiva y decreciente y, para cada $n \in \mathbb{N}$ sea $a_n = f(n)$. Entonces, la serie $\sum a_n$ y la integral impropia de Riemann $\int_1^{+\infty} f(n) dn$ tienen el mismo carácter.

Casos particulares:

i) Series armónicas o de Riemann:

$$\sum_{n \geq 1} \frac{1}{n^k} \text{ converge} \Leftrightarrow k > 1$$

ii) Sea $k \in \mathbb{N}$ fijo. Entonces:

$$\sum_{n \geq 1} n^k |\beta| \text{ converge} \Leftrightarrow \beta < 1$$

iii) Serie geométrica:

$$\sum_{n \geq 1} x^n \text{ converge} \Leftrightarrow |x| < 1$$

en cuyo caso

$$\sum_{n=1}^{+\infty} x^n = \frac{1}{1-x}$$

iv) Serie aritmético-geométrica:

Sea $\sum a_n$ una serie aritmético-geométrica (es decir, $a_n = [a_1 + (n-1)d]r^{n-1}$ donde $d = a_{n+1} - a_n$ y $r = \frac{a_{n+1}}{a_n}$ son la diferencia y la razón, respectivamente). Entonces:

$$\sum_{n=1}^{+\infty} [a_1 + (n-1)d]r^{n-1} = \frac{a_1}{1-r} + \frac{rd}{(1-r)^2} \quad \forall r \in]-1, 1[$$

v) Serie hipergeométrica

Sea $\sum a_n$ una serie hipergeométrica (es decir, $\frac{a_{n+1}}{a_n} = \frac{An+B}{An+C}$ con $A, B, C \in \mathbb{R}$). Se tiene que

$$\sum a_n \text{ converge} \Leftrightarrow C - B - A \geq 0$$

en cuyo caso

$$\sum_{n=1}^{+\infty} a_n = \frac{Ca_1}{C - B - A}$$

Series de términos cualesquiera

Criterios de Dirichlet y de Abel: Sean $\{a_n\}, \{b_n\} \subset \mathbb{R} : \sum |b_{n+1} - b_n|$ es convergente.

i) Criterio de Dirichlet

Si la sucesión de sumas parciales de $\sum a_n$ está acotada y $\{b_n\} \rightarrow 0$, entonces la serie $\sum a_n b_n$ es convergente.

ii) Criterio de Abel

Si la serie $\sum a_n$ es convergente, también lo es la serie $\sum a_n b_n$.

Criterio de Leibniz: Si $\{x_n\} \searrow 0$, la serie $\sum (-1)^{n+1} x_n$ es convergente.