

## Resolución de las ecuaciones de tercer (cúbicas) y cuarto (cuárticas) grado

### 1) Resolución de la ecuación cúbica: Fórmulas de Tartaglia-Cardano

Las soluciones de la ecuación

$$x^3 + a_2x^2 + a_1x + a_0 = 0$$

(si el coeficiente de  $x^3$  no es 1, se divide toda la ecuación por dicho coeficiente)  
vienen dadas por las fórmulas de Tartaglia<sup>1</sup>-Cardano<sup>2</sup>:

$$\begin{cases} x_1 = \frac{-a_2 + \sqrt[3]{y_1} + \sqrt[3]{y_2}}{3} \\ x_2 = \frac{-a_2 + \omega^2 \cdot \sqrt[3]{y_1} + \omega \cdot \sqrt[3]{y_2}}{3} \\ x_3 = \frac{-a_2 + \omega \cdot \sqrt[3]{y_1} + \omega^2 \cdot \sqrt[3]{y_2}}{3} \end{cases}$$

donde

$$\begin{cases} y_1 = -a_2^3 + \frac{9}{2}a_2a_1 - \frac{27}{2}a_0 + \frac{3}{2}\sqrt{3}i\delta \\ y_2 = -a_2^3 + \frac{9}{2}a_2a_1 - \frac{27}{2}a_0 - \frac{3}{2}\sqrt{3}i\delta \\ \omega = -\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}i \\ \delta = \text{Discr}(f) = -4a_2^3a_0 + a_2^2a_1^2 + 18a_2a_1a_0 - 4a_1^3 - 27a_0^2 \end{cases}$$

#### Un caso particularmente fácil:

El polinomio  $f(x) = x^3 + a_2x^2 + a_1x + a_0$  se puede reducir al polinomio  $f(y) = y^3 + ay + b$ , haciendo el cambio de variable  $x = y - \frac{a_2}{3}$ .

En este caso, las fórmulas de Tartaglia-Cardano son:

$$\begin{cases} x_1 = \sqrt[3]{-\frac{b}{2} + \sqrt{\frac{b^2}{4} + \frac{a^3}{27}}} + \sqrt[3]{-\frac{b}{2} - \sqrt{\frac{b^2}{4} + \frac{a^3}{27}}} \\ x_2 = \omega^2 \cdot \sqrt[3]{-\frac{b}{2} + \sqrt{\frac{b^2}{4} + \frac{a^3}{27}}} + \omega \cdot \sqrt[3]{-\frac{b}{2} - \sqrt{\frac{b^2}{4} + \frac{a^3}{27}}} \\ x_3 = \omega \cdot \sqrt[3]{-\frac{b}{2} + \sqrt{\frac{b^2}{4} + \frac{a^3}{27}}} + \omega^2 \cdot \sqrt[3]{-\frac{b}{2} - \sqrt{\frac{b^2}{4} + \frac{a^3}{27}}} \end{cases}$$

<sup>11</sup> Niccolò Fontana (Brescia, c. 1500 - Venecia, 13 de diciembre de 1557), fue un matemático e ingeniero italiano apodado Tartaglia (tartamudo), debido a que en su niñez recibió una herida cuando las tropas de Gastón de Foix tomaban Brescia, su ciudad natal.

<sup>2</sup> Gerolamo Cardano (1501-1576) fue un médico notable, además de un célebre matemático italiano del Renacimiento, un astrólogo de valía, y un estudioso del azar. Este filósofo y destacado enciclopedista, fue autor de una de las primeras autobiografías modernas.

## 2) Resolución de la ecuación cuártica: Fórmulas de Ferrari

Las soluciones de la ecuación

$$x^4 + a_3x^3 + a_2x^2 + a_1x + a_0 = 0$$

(si el coeficiente de  $x^4$  no es 1, se divide toda la ecuación por dicho coeficiente) vienen dadas por las fórmulas de Ferrari<sup>3</sup>:

$$\left\{ \begin{array}{l} x_1 = \frac{-a_3 + \sqrt{P} + \sqrt{Q} + \sqrt{R}}{4} \\ x_2 = \frac{-a_3 + \sqrt{P} - \sqrt{Q} - \sqrt{R}}{4} \\ x_3 = \frac{-a_3 - \sqrt{P} + \sqrt{Q} - \sqrt{R}}{4} \\ x_4 = \frac{-a_3 - \sqrt{P} - \sqrt{Q} + \sqrt{R}}{4} \end{array} \right.$$

donde:

$$\left\{ \begin{array}{l} P = a_3^2 - 4a_2 + 4y_3 \\ Q = a_3^2 - 4a_2 + 4y_1 \\ R = a_3^2 - 4a_2 + 4y_2 \end{array} \right.$$

e  $y_1, y_2, y_3$  son las soluciones de la ecuación

$$g(y) = y^3 + b_2y^2 + b_1y + b_0 = (y - y_1)(y - y_2)(y - y_3) = 0$$

## 3) Imposibilidad de resolución de las ecuaciones polinómicas de grado superior a cuatro, mediante radicales: Abel<sup>4</sup>-Galois<sup>5</sup>

Después de los trabajos exitosos de Tartaglia, Cardano y Ferrari, durante siglos muchos matemáticos buscaron de manera infructuosa una fórmula que diera las soluciones de cualquier ecuación de quinto grado o superior. Fue Niels Henrik Abel (1802-1829) quien demostró de manera concluyente que tal fórmula general no existe. Por poco tiempo aún subsistió el problema de decidir para cuáles ecuaciones de grado 5 o superior sí existen tales fórmulas, pero este interrogante fue resuelto de manera final por Évariste Galois (1811-1832). Además de mostrar la imposibilidad de resolver por fórmulas generales las ecuaciones de cualquier grado mayor que 4, sus trabajos dieron origen a la Teoría de Grupos.

<sup>3</sup> Ludovico Ferrari (1522-1565) fue un estudioso de las matemáticas y en unión con otros colaboradores, siendo el más importante de ellos Cardano, llegó a ser uno de los mayores representantes de la escuela de Bolonia, que se dedicaba principalmente al estudio del Álgebra, con lo que llegó al descubrimiento de la fórmula general para la resolución, mediante radicales, de la ecuación de cuarto grado.

<sup>4</sup> Niels Henrik Abel (Findö, Noruega, 5 de agosto de 1802 - Froland, Noruega, 6 de abril de 1829) fue un matemático noruego, célebre fundamentalmente por haber probado en 1824 que no hay ninguna fórmula para hallar los ceros de todos los polinomios generales de grado mayor que 4, en términos de sus coeficientes.

<sup>5</sup> Évariste Galois (1811-1832) fue un matemático francés. Mientras aún era adolescente, fue capaz de determinar la condición necesaria y suficiente para que una ecuación polinómica sea resuelta por radicales.